

# European recommendations for the management of healthcare workers occupationally exposed to hepatitis B virus and hepatitis C virus

European recommendations for the management of healthcare workers occupationally exposed to hepatitis B virus and hepatitis C virus

*Puro V, De Carli G, Cicalini S, Soldani F, Balslev U, Begovac J et al. Eurosurveillance monthly 2005; 10: 10*

**Palabra clave:** Hepatitis B. Hepatitis C.

Los autores forman un grupo de expertos representantes de nueve países europeos y que participan en un proyecto financiado por la Comisión Europea, por el Ministerio de salud italiano y por el IRCSS, al objeto de proporcionar pautas de actuación frente a una exposición ocupacional a patógenos vehiculizados por sangre y en especial a la hepatitis B y hepatitis C. El panel de expertos se ocupa de los programas educativos, de la declaración del incidente, de la vacunación antihepatitis B previa a una futura exposición y del manejo una vez que ya ha ocurrido. Proporcionan las pautas de manejo post-exposición a una fuente potencialmente contaminada con el virus de la hepatitis B, según el estado vacunal del sujeto y la situación de la fuente respecto al HBsAg. En este sentido es destacable que a diferencia de las pautas del ACIP, en algunos supuestos utilizan dos dosis de inmunoglobulina antihepatitis B junto a la vacuna, y que ésta siempre la utilizan en pauta de 4 dosis: 0, 1, 2 y 12 meses.