

MMR vaccination and measles 2002

MMR vaccination and measles 2002

Samuelson S. EPI-NEWS 2003 (25)

Palabra clave: Triple vírica. Sarampión

Durante el año 2002, en Dinamarca, recibieron la vacuna triple vírica un total de 128.291 niños, habiendo aumentado las coberturas en 9 y 5 puntos, para la primera y segunda dosis, respectivamente referente al año 2001. Durante enero-febrero de 2002 hubo una epidemia en el condado de Jutland y en Copenhague, lo que indudablemente influenció en el incremento de las coberturas, aunque el hecho de que ese incremento fuese nacional claramente indica la buena aceptación de la vacuna.

Durante 2002 se declararon un total de 32 casos de sarampión, de los que 23 correspondían a las epidemias acaecidas en las regiones anteriormente mencionadas. El resto de casos se dieron en los meses de mayo a agosto. 5 casos se registraron en adultos de 20 a 35 años, uno en un menor de 12 meses y 3 en menores de 16 meses. 23 niños no estaban vacunados, de los que 8 eran menores de 15 meses, y 4 adultos tampoco habían recibido la vacuna. Se hospitalizaron 25 pacientes y no se registró ninguna secuela. El caso índice de la epidemia descrita anteriormente se infectó con el virus del sarampión durante unas vacaciones en Filipinas, y 3 casos se infectaron en el exterior (uno en un avión durante un viaje a Asia, uno en Italia y otro en España). Un paciente diseminó el virus a Noruega donde se infectó un adulto inmunodeficiente. En un comentario adicional, se recomienda la vacuna triple vírica antes de emprender viajes al exterior en no vacunados con anterioridad y también en adultos viajeros que no recuerden haber padecido la enfermedad.