

Profilaxis antipalúdica en viajeros a la República Dominicana

Recientemente se está produciendo un incremento del número de casos de malaria por *Plasmodium falciparum* potencialmente letales en viajeros europeos (7 casos) y norteamericanos (2 casos) a la República Dominicana. Uno de los casos europeos era un residente del Reino Unido que regresó el 5 de noviembre de unas vacaciones de 2 semanas en Bávaro, al norte de Punta Cana. Otro paciente era español y 5 alemanes. Todos habían viajado a esa zona. Dos pacientes se han reportado en los Estados Unidos (1 procedente de Punta Cana y otro de San Francisco de Macorís). 3 pacientes son canadienses. Ninguno de los afectados tomó quimioprofilaxis. Como medida de precaución, las Autoridades Sanitarias alemanas, las canadienses y las estadounidenses recomiendan incluir profilaxis con cloroquina a todos los viajeros a todas las áreas de la República Dominicana incluyendo los que vayan a los complejos turísticos de la costa este. Las agencias de viajes deben de recordar a sus clientes que deben buscar consejo médico previo a la partida y se deberá investigar para malaria a los viajeros que presenten fiebre tras regresar de una zona endémica.

Lawrence J, Stark K. [Change in prophylaxis recommendations in responses to falciparum malaria in travellers to the Dominican Republic](#). *Eurosurveillance weekly* 2004; 8: 49

[[más información](#)]