

Vacunación antineumocócica en grupos de riesgo

Respuesta del Experto a ...

Vacunación antineumocócica en grupos de riesgo

Pregunta

Estimado comité. Hemos recibido una circular del distrito indicándonos que en niños de riesgo se ofertar vacuna de gripe estacional simultanea a vacuna antineumococica. Si el niño es menor de 2 años proponen la antineumococica de hepta o decavalente (prevenar o sinflorix) y si el niño es mayor de 2 años con la de polisacaridos P-23.

Mi pregunta es:

- 1- En niños que hayan recibido ya 2-4 dosis de prevenar es recomendable administrar sinflorix?.
- 2- En mayores de 2 años y menores de 5 está indicada la P-23 en lugar de prevenar o sinflorix?.
- 3- Independientemente de la gripe en niños que no han recibido ninguna o 1-2 dosis de prevenar es recomendable iniciar o seguir con sinflorix?

Muchas gracias.

Respuesta de José Antonio Navarro (25 de Septiembre de 2009)

1. Si son de riesgo y han recibido una pauta correcta de vacuna heptavalente, deberán recibir a partir de los 2 años una sola dosis de vacuna de 23 serotipos.
2. Si en su CA ofertan la vacuna heptavalente para menores de dos años de riesgo, a partir de esa edad deberán recibir una

dosis de la vacuna de 23 serotipos.

3. La tercera pregunta ya está contestada en:
[https://www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view
&id=9531&Itemid=427](https://www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=9531&Itemid=427)