

# Vacunación y enfermedad psicogénica masiva

## Respuesta del Experto a ...

Vacunación y enfermedad psicogénica masiva

### Pregunta

Sobre la vacuna HPV, relación de autismo y desmayos. He recibido varios padres que se niegan a querer vacunar a sus hijos. Gracias.

### Respuesta de José Antonio Navarro (04 de Diciembre de 2018)

Después de más de 300 millones de dosis administradas de vacuna VPH los sistemas de vigilancia postcomercialización y los estudios observacionales no han probado ninguna asociación causal entre la vacuna y los trastornos del espectro autista. Son relativamente frecuentes los episodios psicogénicos masivos tras la administración masiva de cualquier vacuna (en centros docentes, establecimientos militares...), asociados al propio acto vacunal y no a los componentes de la vacuna (a veces aparecen incluso antes de la inyección). Se trata de síncope vasovagales autolimitados y de resolución espontánea<sup>(1,2,3)</sup>. De ahí la recomendación de un periodo de observación postvacunal de quince minutos. Dispone de medidas tendentes a evitar la aparición de esos episodios en las vacunaciones escolares<sup>(4)</sup>.

### Referencias

<sup>(1)</sup> Simas C et al. HPV vaccine confidence and cases of mass psychogenic illness following immunization in Carmen de Bolivar, Colombia. Hum Vacc Immunother 2018. DOI: 10.1080/21645515.2018.1511667

(2) Loharikar A et al. Anxiety-related adverse events following immunization (AEFI): A systematic review of published clusters of illness. *Vaccine* 2018;36:299-305

(3) Global Advisory Committee on Vaccine Safety, World Health Organization. Clusters of anxiety-related reactions following immunization. *Wkly Epidemiol Rec* 2016;91:21-32

(4) Servicio de Prevención. Vacunación escolar. Consejería de Salud. Región de Murcia, Disponible en: <http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=303584&idsec=829>